

胎
產
心
法

胎產心法卷之中

脉訣歌

欲產之婦脉離經。

一息六至、一息三至、皆曰離經、又云、脉如歇止、亦謂之離經、

沉細而

滑也同名。

腎脉沉滑、與離經同、

夜半覺痛應分娩。來朝日午定當生。

身重體熱寒又煩。舌下見脉黑且青。捲舌流涎腹覺冷。腹

中子女已歸陰。面赤舌青細尋看。母活子死是定斷。唇口

俱青沫又出。母子雙雙入鬼案。面青舌赤沫又頻。母死子

活定知正。新產婦脉緩滑吉。實大弦急死相侵。若得沉而

小者昌。忽若堅牢。命不長。寸口澁疾不調。死。沉細附骨不絕生。吉凶生死全憑脉。診者須教指下明。

啟蒙曰。欲產之婦。脉離經。離經之脉。認分明。其來大小不調勻。或如雀啄。屋漏。應。腰疼。腹痛。眼生花。產在須臾。却非病。○脉經云。脉勻細易產。大浮緩氣散難產。

保產論

凡妊娠之於分娩。母子性命懸於頃刻。調理失宜。安反成危。將養有方。逆可使順。故凡胎前諸證。當隨證加減。保護調理。甫及臨月。若婦女初產。原未慣經。不免驚畏失錯。雖

慣產之婦。然氣血亦傷。又安得恃爲無虞也。是以保產之方。斷不可廢。故達生散。宜用於八九月之時。而養胎神寢等藥。當用於臨月之際。倘遇過月不產。則補血行氣之方。不可稍緩。至於居處失宜。頓撲動胎。及身居安逸。食物不節。憂樂不常。致胎氣難轉。或胞漿先破。惡水來多。胎乾不下。則保生千金不換萬全保氣滑胎等劑。猶宜按證選方製服。予家傳胎產金丹。不特治胎前產後爲第一奇藥。卽臨產服之。保生易產。且勝催生諸藥。更無產後諸患。若製此藥。備用較勝諸藥萬萬矣。至於神煞符咒。亦難謂盡妄。

如受胎之後。胎殺所在。不惟損胎。甚至損母。俱宜謹慎。而臨月安產。產下藏衣。猶爲緊要。不可不知。至所謂雷公招搖。運兒力士。天狗等神方向。及生氣方之宜向。禍害月。絕命方。八床方之宜避。昔人填入產圖。使人知所趨避。似屬太瑣。若拘拘於圖。又不免避此觸彼之疑。不若體元子之借地法。既可以避神煞。又可以消俗疑。因並錄之於後。

達生散 孕婦八九個月時。宜服數劑。

人參

陳皮

紫蘓

各五分

白芍

酒炒

白 木 土炒

當 歸 酒洗各一錢

炙 草 三分

大腹皮 一錢五分用黑豆汁洗晒

黃楊腦 三個即黃楊樹葉稍兒也

葱 白 三根

水煎服。○春加防風 五分 川芎 五分 ○夏加酒炒黃芩

五分 酒炒黃連 五分 五味子 十粒 ○秋加澤瀉 五分 ○

冬加砂仁 五分 ○或通加炒枳殼砂仁 ○胎動不安加

金銀箔 此須 野苧根 一錢 生地黃 一錢 ○氣上逼心加

柴胡紫蘇 ○多怒人加炒黃芩佐之 ○食少者加砂仁

炒神麴 ○口渴加去心麥冬酒炒黃芩 ○能食倍加黃

楊腦。此味瘦胎，若胎瘦不用。

○有痰。加薑製半夏。炒黃芩。○予按

達生散。即紫蘓飲方。去川芎。加黃楊腦、白朮。○又一方。

無當歸、白芍、白朮。

密傳達生散。孕至八九個月。服之。易產。奇效。

大腹皮。三錢、黑豆水洗淨。

人參

紫蘓。連莖葉。

陳皮

炙草

砂仁。各五分。

白朮。土炒。

白芍。酒炒。

當歸。酒洗、各一錢。

枳殼。七分、麸炒。

青葱五根。水煎、食前服。至十餘劑。甚得力。○予謂前達生散。不及此方穩妥有效。但大腹皮體輕。此方用三錢。似乎太過。不若依前方一錢五分。或加至二錢。則此方更覺全美矣。

養胎散 宜與神寢丸兼用。

當歸 酒洗

川芎

黃芩

陳皮

白朮

土炒

製香附

各一錢

白芷

甘草

各三分

人參七分、人虛者倍之、

水煎去渣。調益元散服。○臨產、小便多者、不宜加益元散。

神寢丸 臨月服之易產。氣盛者可服。素虛者忌用。

乳香一兩、透明者另研、枳殼二兩、麩炒、

爲末。煉蜜成丸。如梧子大。每早溫酒送下三十丸。

保生無憂散 臨產服之。補其血。順其氣。自然易產。

當歸酒洗、川芎

白芍酒炒、枳殼麩炒、

乳香

木香

血餘

右等分。每服二三錢。水煎。日二服。神效。爲末。服三錢亦可。○或胞肥厚。根蒂堅牢者。服之。使其易產。○又治小產。瘀血腹痛。○如臨產。胞衣既破。其血已涸。或元氣困憊。非此藥可治。急用八珍湯。飭許。水數碗。煎熟。時飲救之。亦有得生。

千金不換方

一名保產無憂散

當歸

酒浸

川芎

胎產心法

卷中

預服易產諸方

五

兔絲子

各一錢五分

黃 蓍

八分、蜜炙、

白 芍

一錢二分、冬季用一錢、

川貝母

一錢、去心、

枳 殼

六分、麸炒、

厚 朴

七分、薑汁炒、

蘼 艾

羌 活

各五分、

荊芥穗

八分、

生 草

五分、

加生薑二片、水二碗、煎八分、空心服、臨產不拘時服、製度分兩、不可加減、○如臨產一二日前、覺動履不安、服

一劑、可保無憂、此方屢經試效、

保氣丸 治孕婦居處失宜、頓撲動胎、服此寬氣進

食。瘦胎易產。

製香附

木香

各四分

山藥

二兩

益智仁

五分

砂仁

粉草

各一兩

紫蘓葉

五分

爲末。煉蜜成丸。如梧子大。每服二錢。滾水送下。

滑胎煎 胎氣臨月。宜常服。數劑。以便易生。

當歸

三五錢

熟地

三錢

杜仲

鹽水炒斷絲

山藥

炒各二錢

川芎

枳

殼

麩炒各七分

水二鍾煎八分。食前溫服。○如氣體虛弱者。加人參、土炒白朮、隨宜用之。○如便實多滯者。加牛膝一二錢。

滑胎散 臨月服之易產。

人參

八分、如壯實不用、

陳皮

七分、

川芎

製香附

黃芩

紫蘓

大腹皮

各八分、黑豆水洗淨、

白芍

炒、

白朮

土炒、

當歸

酒洗各一錢、

砂仁 五分

炙草 三分

加薑三片。葱頭一個。水二鍾。煎八分。溫服。○如冬月。加
麩炒枳殼 一錢。○尊生書云。孕婦月足臨產。八珍湯。預
服十數劑。最易生育。再無難產之患。

家傳胎產金丹 治婦人經水不調。諸虛百損。種子

安胎。及胎前產後諸證。應效如神。

當歸 酒洗

丹皮 水洗。晒乾。勿見火。

蘼艾 醋煮

延胡索 酒拌。炒乾。

川芎

益母草 取上頭半截。童便浸
晒乾。

胎產心法

卷中 預服易產諸方 七

青蒿

人多內熱者更宜、不用亦可、

白薇

洗淨、人乳拌、

人參

赤石脂

火煨、水飛亦可、

白茯苓

川蘂本

洗淨、

白朮

土炒、各二兩、

生地

酒洗煮、不犯鐵器、

鱉甲

醋炙、各四兩、

香附

共四兩、醋、酒、鹽、童便、各浸製一兩、

桂心

沒藥

去油、

粉草

酒炒、各一兩二錢、

北五味

一兩、去梗、焙、

沉香

六錢、

以上共爲細末。再用新鮮頭次男胎紫河車一具。長流

水浸半日。洗淨。黑鉛打成大鉛礮一個。將河車放在鉛礮內。再將黃栢四兩。放在河車下。加白酒娘二觔。清水二碗。灌滿鉛礮。仍以鉛化封口。再以鐵鍋盛水。將鉛礮懸在鍋內。煮兩日夜爲度。取出搗爛。和入藥內。拌勻晒乾。再研爲末。煉蜜丸。彈子大。每丸重三錢五分。水飛硃砂爲衣。再以黃蠟爲皮。如蠟丸式收貯。治證開後。

一婦人臨產。米湯化服一丸。助精神氣力。分娩順利。

一產下。童便好酒服一丸。神清體健。再無崩暈之患。

一產後。每日服一丸。服過五日。氣血完固。自無他病。

一行經後。川芎當歸湯服一丸。服之三日。必然有孕。
一苦於小產者。胎動欲產。白滾湯服一丸。睡半日。其
胎自安。每月常服二三丸。保全足月。分娩無憂。

一產後。血崩。童便好酒服一丸。卽止。

一產後。血暈者。當歸川芎湯服一丸。卽醒。

一產後驚風。防風湯服一丸。卽解。

一兒枕痛者。山查黑砂糖湯服一丸。卽止。

一胞衣不下。乾薑炒黑煎湯服一丸。卽下。

一產後虛怯者。川芎當歸湯。每日服一丸。十九全愈。

一凡產後諸證。俱加好酒童便服。皆保命護身。回生起死。其功不能盡述。家有孕婦者。宜早脩之。

催生萬全湯

見本卷催生門

益元散

見下卷淋證門

八珍湯

見上卷諸痛門

胎殺方位

孕婦宜避

正月在房床。二月在窓戶。三月在門堂。

四月在灶。五月在身床。六月在床倉。

七月在磨碓。八月在側戶。九月在門房。

胎產心法

卷中

胎殺方位
生胎宜向方 遊神方位 九

十月在床房。

十一月在爐灶。

十二月在房床。

子丑日在中堂。

寅卯辰酉日在灶。

巳午日在門。

戌亥日在房。

未申日在籬下。

房中遊神方位

忌安床、換帳、

甲辰、乙巳、丙午、丁未日、在房內東。

庚子、辛丑、壬寅日、在房內南。

六戊、六己日、在房內北。

生子宜向方

子午卯酉日、宜西南。

寅申巳亥日宜西北。

辰戌丑未日宜東南。

安產藏衣宜向方

正、三、五、七、九、十一月、壬日安產。丙位藏衣。其餘皆雙月。甲位安產。庚位藏衣。○又云、藏衣忌太歲方。三殺方。宜用稍大平穩磁瓶。將衣胞內安入五種菓子。如棗兒、蓮子之類。每樣數枚。宜單。取再生兒之意。並將胞埋深土。以防畜類刨挖。安放平穩。令兒不驚。瓶器稍大。兒不吐乳。至於遊年白虎殺神。安產藏衣俱忌。太歲退一位卽是也。如子年在

亥。丑年在子。餘以類推。

體元子借地法

凡孕婦臨月。擇天月二德吉日。令善書者。先期齋戒三日。至日。汲新水研硃。於黃紙上。焚香書曰。東借十步。西借十步。南借十步。北借十步。上借十步。下借十步。壁方之中。四十餘步。安產借地。或有污穢。或有東海神王。或有西海神王。或有南海神王。或有北海神王。或有日遊將軍。白虎夫人。遠去十丈。軒轅。招搖。舉高十丈。天符。地軸。入地十丈。令地空閒。產婦某氏安居。無所妨碍。無所畏忌。諸神擁護。百

邪速去。急急如律令。書畢。貼孕婦牆壁上。則不須避忌矣。

臨產須知十四則

一、孕婦似產未產。須知凡胎孕臨月。胎忽亂動。而腹痛不甚。或作或止。或一二日。或三五日之後方生。名曰弄胎。不可孟浪坐草。須靜以待時。或胎水已來。腰不痠痛而不生者。亦曰弄胎。所以有瀝漿生。其漿流一二日不產。俟流漿漸少方生。倘漿來過多。恐胞乾難產。亦非所宜。須八珍時服助。其血氣可望無慮。又有一月前。忽然腹痛。狀如卽產。却不產者。名曰試月。又有腹雖痛而腰不痠痛。脉未離經。

而不產者。又有腹雖痛而未下垂。胎雖轉而兒身未正。亦非當產時也。要知腹中痛陣。乃兒破衣轉身也。氣壯者。轉身自易。氣弱者。轉身較難。衣薄則破速。衣厚則破遲。所以有腹痛一二日方生。凡孕婦須當寬心。以待其自然之勢。切不可亂用氣力。強產以致枉命。至于自然當產之時。必有緊陣。如臍腹痛急。腰痠重痛。眼中如火。肛門迸急等類。齊至。待兒身已正。頭到產門。用力一送。卽下。然亦有腹覺微痛。或腹竟不痛。止覺腰痠下墜而產者。蓋腎候於腰。胞繫於腎。故也。古人云。時至自然分娩。譬如登廁。未急不能。

催時急不能止。此理雖俗。知此免患。

一△臨產自有先兆。須知凡孕婦臨產。或半月數日前。胎腹必下垂。小便多頻數。至欲產時。脉先離經。拭捏產婦手中指中節。或本節跳動。方是臨盆時候。

一△轉胎調攝須知。凡孕婦兒身轉動。其腹必痛。雖遲日不生。切忽驚怕。且令人扶持。在房中行走。或倚物而立。直其體腹。倘精神稍困。則以被褥壅墊脊背。仰臥少頃。又令行立。聽腹中慢慢轉身。雖遲無害。且宜稍寬裙帶。以便兒在腹中轉舒有餘地也。若不禁痛苦。或偃僂屈曲。斜倚側靠。

胎中不免爲之擁擠。迷其出路。穩婆不解此理。但見生遲。頻頻試水。悞傷胎破。或風入產戶而成腫脹。或胎未至而胎水先乾。分娩愈難矣。遇此者。惟令產婦勉強飲食。調其氣息。或用活血滑胎之藥佐之。活血滑胎藥方。俱見催生門。候子逼門。戶方儘力一努。胎隨漿下矣。此乃瓜熟蒂落之理。切不可預使氣力。令精神失倦。臨期反致疲困。此產家最要緊處。曾見一婦。臨產畏痛。曲身坐臥。以致胎元轉動不順。兒出胞時。尋到產門。被母曲身遮閉。因不得出。少頃再轉。母又護痛再閉。如此兩三遭。則子無力而不能動。至於難生。人

又見子不動。則謂死胎。其實子無力。非死也。隨令產母正其體腹。不時行動坐立。心安氣和。勉強飲食。俟兒少停氣復。再轉至產門。果順易生下。

一穩婆宜加選擇。須知凡孕婦臨產。當選年高有經識穩婆。及純謹婦女。一二人扶持。倘誤用無知孟浪婦女收生。不審察是正產與轉胎。一見腹痛。亂將雙手摸孕婦腹上。夾腹兩邊重按。欲其直下。以免橫生。此第一悞人性命者。夫腹初痛。則胞衣未破。而欲破之時也。兒將分娩。心中亦有靈性矣。見腹外揣摩。兒不知爲何物。遽生驚恐。則縮不

敢動胞衣。又何時而得破乎。更有穩婆無知害人。私用手
指搯破水衣者。極須防範。夫胞漿乃胞內養兒之水。兒既
折破。自隨水而下。若過時不得分娩。是胞元無力。轉頭較
遲。恐致漿盡血來。閉塞道路。令子無路可通。胎澁不行。用
保生無憂散以固其血。如血已耗。八珍湯加益母草濃煎。
時飲之。倘元氣困憊。急用上好人參兩許。當歸二錢煎飲。
飲盡再煎服。助其氣血。最爲得力。捨此而用催生耗氣諸
藥。總無一效也。或先服八珍補養氣血。次煎濃葱湯。令穩
婆洗產戶。使氣上下通暢。更用酥油滑石塗產門。次服催

生萬全湯亦妙。

一臨產避忌須知。凡孕婦臨產之月。不可洗頭濯足。犯者胎多難產。若至臨盆之際。凡係門窗箱籠瓶甕之屬。俱宜鬆開。以及一切外來親戚。並孀婦閨女。喪孝尼姑。與穢污不潔。或月經適至。或原有體氣婦女。皆足以觸胎致殃。俱宜防備避忌。俗忌多人知覺。蓋多一人入房。則多一時遲延。此雖俗論。却有至理。恐產婦心煩。以致難產也。

一臨產宜肅靜須知。凡孕婦臨盆房中。不得喧鬧。即有意外緊事。戶外不得叫喊。倘令產母恐懼驚心。則胎滯氣結。

不行而難產。經云驚則神散。憂則氣結。恐則氣怯。怯則上焦閉。閉則氣還。還則下焦脹。氣乃不行矣。此氣結不行以致難產。更有產母兩尺脉絕。他脉平和。此乃下焦脹。氣閉不行。難產之脉。急用紫蘓飲散結行氣而產矣。

一臨產飲湯須知。凡孕婦分娩之時。心下煩悶口渴。用白蜜半盃。溫湯化開飲之。如欲飲水。但可與清米湯飲之。蓋蜜能潤燥滑胎。米飲能助中氣也。有人臨產進飲食及服藥而皆吐出。吐後仍進飲食服藥。使其人不乏力。不乾澀。亦自立下。不必慮其吐出也。是以產母不可令其饑餓。饑

則中氣虛乏。無力送胎。須少用梗白米稀粥。或飲以母鷄
羹汁。但不可食肉。及堅硬食物。恐凝於上焦。氣不得下。不
惟難產。須防內傷。又不可太飽。常令稍饑爲佳。蓋饑則氣
下。氣下則產速也。予謂口渴。不能食。及吐。須飲以獨參湯。
最妙。且能催生。

一孕婦產異。須知凡婦人常產之外。有異產者八。曰橫產。
逆產。坐產。碍產。偏產。脹後產。盤腸產。浪躋產等名。皆由孕
婦氣血虧虛。或坐草。探水。用力太早所致。凡遇此等異產。
須令產母仰臥。勿得驚懼。選其歷練有經識穩婆料理。各

產治法。列之於後。

如橫產。手先露者。世傳爲覓鹽生。令產母安心仰卧。以鹽塗兒手心。再以香油抹其所出之手。穩婆輕輕送入。或兒手得鹽。肌肉醃螫。且痛且縮而收者。待兒轉身頭正。扶起產母。用力一努。兒卽出矣。

如逆產。足先露者。相傳爲踏蓮花生。令產母仰卧。不必驚憂。用鹽塗足心。亦用香油抹其所露之足。穩婆輕輕送入。候兒轉身頭正。用力生下。凡遇橫逆之產。母子存亡在頃刻。若無急救之方法。何以成醫之神聖歟。其胎產之所以

致橫逆者。或因兒身尙未轉順。方轉至手足。被產母用力逼出。或因產母氣血素虧。其子無力轉身。而手足先出者。俱速用塗鹽抹油法送入。其用力逼出手足者。送入猶易。轉正。勿藥亦可。若素虛無力轉身者。急煎救逆湯服之。助其氣血。送入少頃。兒自有力。轉身俟頭正產門而生下矣。但兒之手足切不可任其久出。更不可令其多出。若見兒手或足畧出時。則急以鹽塗法治之。若出多及時久。則手足青硬。難以送入。而子必傷。切不可悞聽。竟婦用刀斷兒手。足一動。刀刃子必腹中亂擾而傷母矣。世有用針刺兒

手足者。有治逆產。用手抓兒足心者。予謂恐兒驚縮。有傷觸母心之虞。不若鹽塗爲便也。

如坐產。醫先露者。世俗爲坐醫生。令產母仰臥。亦如前法。抹油推入。候兒轉運扶正。然後用力送出。或於當高處。牢繫手巾一條。令產母以手攀之。輕輕屈足舒伸。以開生路。兒卽順生。

如礙產。乃門戶俱正。兒亦露頂而不下者。此必臍帶絆住兒肩。俗名背包生。亦令產母仰臥。穩婆輕輕推兒向上。以手、中指、輕按兒肩。摸去臍帶。扶正兒身。一努卽生下。

如偏產。乃生路未正。被產母用力一逼。兒頭偏抵產戶不下者。不知者。但云兒已露頂。非頂也。乃額角也。亦令產母仰臥。輕輕推兒近上。以手正其頭。用力一送。卽下。

如脹後產。乃兒頭後骨偏柱產母。穀道不得下者。令穩婆以棉衣炙煖裏手。急於穀道外傍。輕輕推頭令正。然後用力卽生下矣。或用膝頭令產母抵住亦可。

如盤腸產。子腸先出者。世人莫不驚畏。然無妨碍。令產母安心仰臥。急將淨盆盛溫水。冬則再加稍熱。加入香油養潤。待兒並胞衣俱下。穩婆香油塗手。徐徐送入。令產母兩

足夾緊穀道。腸自收上。有用醋和冷水。令人噴面。一噴一收。以漸收之。又有神應丹貼法。然此噴貼之法。腸雖可收。予恐誤事。不若皂角末吹鼻。嚏作自上。又有腸被外風吹乾不收者。用磨刀水少許。火上溫過。以潤其腸。後用好磁石煎湯一盞服之。其腸自收。又有兒並胞衣下後。膀胱卽尿胞壅出產戶者。同前法送入。凡此子腸膀胱先出。皆平日氣虛。因努脫出。並用力太早。內臟動搖。氣虛下元不固。關鍵不牢之故。若此番經過。須防下次。此後無孕時。多服地黃丸。加五味子。肉桂。各一兩。以固下元之關鍵。及有孕多。

服胡連丸。加人參以補氣。又服三補丸以涼血。如滑胎、瘦胎等劑。不可輕服。八個月時。宜服八珍。加訶子、瞿麥、粟殼、蜜十餘劑。予意須預服補中湯。升提之藥。於前庶臨盆可免較之服胡連、三補。以及粟殼等藥。穩妥而不繁雜也。如浪臍產。胞衣、臍腸先出者。凡兒出胞時。頭必轉向產門。自然正產。若無力轉運。脚踏胞衣。臍腸先出。急令穩婆理清推入。稍俟氣平。乘勢就其脚下。不可推轉久延。久則臍腸復下。便難收拾矣。

一臨產雙生須知。凡孕婦臨產。一兒已下。又見一兒。此係

雙胞。惟穩婆自知之。只云取胞。待生下方言。恐驚母成產患也。

一△候胞衣生下△須知。凡產母生子出戶時。人卽以兩手抱產母胸前。產母亦自以手緊抱肚腹。令胎衣下墜。如胎衣來遲。切勿慌忙。用草帚燒烟熏鼻卽下。如再遲。則急斷臍帶洗兒。仍用軟帛物繫墜臍帶。此帶極脆。繫時猶宜輕巧牢固。然後截斷。若不斷臍帶。恐血反潮入胞中。脹而不下。攻心則傷。如穩婆諳事者。能以手指取下甚便。取法見後胞衣不下門。

一悶臍生須知。凡兒產下卽啼。此正理也。如兒下地。氣悶不啼。相傳寤生。呼父乳名。手拍兒股卽啼者。此理亦未講明。蓋兒糞門有一膜。悶住兒氣。故不能出聲。拍之則膜破。而能叫哭矣。如拍之猶不破。須令女人中有輕巧者。以銀簪腳輕輕挑破。甚便。或不能挑。急用棉絮煖衣。將兒緊包。抱於懷內。勿令散放。未可撻斷臍帶。速用熱水浸其胞衣。寒天則置炭火中煨之。仍作大油紙。撻點燈於臍帶上。往來燎之。蓋帶連兒臍。久則熱氣內鼓。其膜自破。膜破則出聲而甦。方可斷帶洗浴。亦有用蘄艾爲撻。香油浸潤薰臍。

帶至焦。使熱氣內鼓破膜。又一法。用燈心顙門點爆數下。均治悶臍生法也。

一兒生卽死。須知。凡兒生下卽死者。急看兒口中前上腭上有泡。以手指摘破。用帛拭血令淨。若血入喉卽死。去血卽生。其泡中白米。如針嘴尖。亦須括去。不可令其入喉也。一凍產須知。凡孕婦臨盆時。值冬月天寒。產母經血因冷則凝。致兒不能速下。務於房內四處設爐置火。常有煖氣如春。且下部不可脫去棉衣。併不可坐卧冷處。使產母背身溫和。臍下腿膝間常煖。血得熱則行。兒自易生也。炭須

在房外燒紅。送進產房。否則生炭氣味。恐產婦發暈。

一熱產須知。凡盛夏產婦。要溫涼得所用。冷水房內洒灑。或多放水盆。或遠設水塊。以解其鬱蒸之氣。若遇風涼陰雨。亦當謹避。不可貪涼。恐增疾病。房內不可人多。恐熱氣逼襲。令產母心煩熱血沸騰。有鬱冒冲暈之患。

救逆湯 治產母氣血素虧。子無力轉頭。手足先出。

人參 一兩

當歸 三兩

川芎 二兩

紅花 三錢

水煎速服。久之不順。再煎再服。

三補丸 專治血熱。

黃芩

炒

黃連

炒

黃栢

炒

各等分爲末。蜜丸。白湯下。

八珍湯

見上卷諸痛門

保產無憂散

見本卷預服易產諸方

催生萬全湯

見本卷催生門

紫蘓飲

見上卷安胎門

神應丹

見本卷催生門

六味地黃丸

見上卷諸痛門附六味地黃湯下

胡連丸

見上卷安胎門

補中益氣湯

見上卷諸痛門

難產有五因

一凡婦人懷孕。惟賴氣血養護。時常行動。則氣血週流。胞胎活動。骨縫關節處。亦常鬆動。臨產自易。如久坐久卧。氣不運行。血不流順。胎亦沉滯。而不活動。骨節亦緊而不鬆。泛故令難產。常見田野勞苦婦人。忽然途中腹痛。立便生產。可知。

一胎之所以養。賴母之所嗜。因子母之氣。呼吸相通。是以胎之肥瘦。在母之素日奉養厚薄何如耳。如母平時恣食厚味。不知節減。多致胎肥衣厚而難產。常見糟糠之婦。容易生產可知。

一古者婦人有孕。卽居側室。不共夫寢。恐慾火動中。氣血沸騰而消耗。胎繫胞中。全資氣血育養。一有所犯。五月以前。故多胎漏小產。五月以後。每致胞厚難生。更且漏洩胎元。子多不壽。瘡痘疹毒。子疾難醫。不然。但看馬牛犬豕。胎胎易。個個存。何也。蓋因馬牛犬豕。一受孕後。絕不交合。而

人受孕。不能禁絕。矧有縱慾無度者乎。人畜不同。稟生則一。可不慎歟。

一凡新婦初產。神氣怯弱。未曾經慣。切不可與言產變之事。恐懷憂懼。心懸氣餒。原本易生。反成難產矣。況子戶未舒。更恐護痛。腰屈不伸展。轉傾側。撩亂多時。精神困乏。兒不得出。卽中年婦人。生育既多。氣血虛少。均慮產時艱難。氣血虛少。精神困乏。俱宜獨參湯催生甚妙。餘則參看臨產須知。併催生及交骨不開門。

一孕婦有素常虛弱。飲食減少。至臨產乏力者。或因兒未

欲出。用力太早。及兒欲出。母已無力。令兒停住。產戶乾澀。產亦艱難。用催生萬全湯最妙。或獨參湯。催生亦妙。有等婦人。臨產不能飲食。用人參三二錢煎湯服之。大助精力。甚於肉食百倍。

催生論

經曰。一息不運。則機緘窮。一毫不續。則霄壤判。所謂氣血周流。循環一身。無有間斷也。是以姙子者。兒在腹中。母子一氣流通。全賴漿水滋養。十月數足。其子形神俱備。氣血完全。忽如夢覺。自然求路而出。兒既出胞。母子分體。呼吸

殊息。豈可久羈於內。而使氣血不運不續哉。所以產子。譬諸果熟蒂落。有自然分體之勢。豈可早用催藥。似逆其性。至於催藥。原爲調扶。失宜致成難產。不得已而用也。如胎壯。則隨漿易產。何必用藥催生。若胎弱。則轉慢遲生。有致困乏。漿乾。瘀塞不下。橫逆子死。難產等類。治者滋其榮。益其氣。使子母精神接續。運行得力。溫其經。開其瘀。使道路通暢。子易轉舒。再得老成穩婆。在外細心接取。自獲大小平安。切勿用力太早。虛費精神。猛劑催生。反傷血氣。更不可妄信符水。况符水非得正傳。亦未必靈驗。且血得寒則

疑血凝則胎亦滯矣。何能望其速生也。○夫產育一門。全仗氣血用事。無補精神之藥。焉圖胎產之功。徒傷氣血之和。反貽產後之疾。加獨參湯者。大補元氣。助精神而生津液。臨產服之。易生。再如催生萬全湯。細心周匝。補接開導。升降溫行。產際用之。催生甚爲有益。產後亦脩得其宜。是以名爲萬全湯者矣。後開催生諸方。以脩擇用。其內有治橫逆產者。當用臨產須知內手法施治爲上。但恐人又不善用手法。致產母經久困乏難生。不得不借藥力。助其氣血精神。使兒轉正速生也。丹溪用佛手散。治死胎不下。並

催生最效捷。予曾用胎產金丹催生。死胎亦下。再催生湯。催生甚穩而效。

獨參湯

附論

催生第一方。

人參 二三錢或四五錢

論曰。人參固爲催生之妙品。然用之不得其法。往往有失誤之處。而人不知覺也。若生產之痛陣未來。兒先必轉胎腹痛。人未明此理。以爲將生之時。卽煎參湯與飲。助其氣力。未免失之過早。如產母平素氣血虧虛。則有益無害。若遇壯實婦人。並非因虛難產。致提固胎氣。上

逼心胸。脹悶不下。反成難產矣。如生陣已來。腰痠腹痛。穀道迸迫。目中流火。適值兒正出戶。方飲參湯。且一飲而盡。豈不失之過遲而急。及產下之後。正欲逐瘀之時。其參力方銳。瘀血受補凝滯不行。勢必上行奔心等患。且有用至一二兩者。尤宜慎之。是以古人治產後。非急證。不用人參。且多以芎歸合用。其意深矣。予謂臨產之時。預脩上好人參四五錢。如產婦少壯。臨盆安順。亦無需參湯以助其力。如中年產婦。育產過多。或平素瘦弱。或生產艱難。經日不下。或錯過生陣。或亂用氣力。以致。

氣乏力倦。及至正產之時。反無力送胎。可用人參二錢。或三錢煎服。自然易產。至于尋常生育。恐臨期艱難。預用人參二三錢煎就。用重湯溫着。俟漿胞破時。令產婦飲兩三口。以助氣力。少停再飲二三口。頻與漫服。不過助其氣力。以催生耳。生下卽已。不必多參。盡飲以招尤也。或用上好人參一枝。含口內。生津助氣亦妙。至於橫逆等生。須用前論手法施治。再服參湯以助之。蓋人參能補氣升提。使產母不至倦乏。亦能令兒升舉。轉身爲順。自易生矣。

催生萬全湯 附論

人參 三錢至五錢、大補元氣以爲君、

當歸 三錢、大補榮血以爲臣、去蘆、

川芎 一錢、入肝以疎鬱滯、少寓升提之性、則降下之藥得力、

菴仁 十三粒、不去皮尖、搗碎、取苦可去舊、甘能生新、滑能潤下、

乾薑 一錢、溫能通行血分、炒焦黃色、焦則令其下降、而遏其上升也、

炙草 六分、令其藥性少緩、中宮得受補益、不使卽爲下墜也、

牛膝稍 二錢、既能下行、腹走十二經絡、令其經絡無壅、則氣血效力、以爲運行推出之勢、

紅花 三分、多則破血、少則活血生新耳、酒炒、

肉

桂

臨煎方去皮切碎六分冬天用八分借此引經率領諸藥直入血分且溫可通行散瘀則生產自易

加膠棗一枚水煎食前溫服如產婦壯實及無力服人參者去參用之其催生之效尙能倍於佛手散多多矣

論曰婦人臨產關係母子性命實存亡頃刻之時是以古人立方甚多然產育乃大傷氣血者也其難產又多由氣血不足產後諸疾固屬氣血大虧然產後諸虛皆因產前所致奈佛手散免腦丸及葵花益母諸方無非活血順氣滑胎破瘀溫煖通竅以圖運行推出之勢全不管運行推出之源產婦精力壯者藉此開導得以易

生。倘氣血不足。則雖有催生開導之功。而無運行藥勢之力。抑何補哉。至於手握石燕。足貼草麻。設遇實證。順證。假此安心候時。如當氣血精神虧極。用此敷衍之方。神氣內竭。勢如隔靴搔癢。不調氣血。而強用催生。何以爲運行之具。徒存虛名。而無實效。誤人性命於頃刻。豈不痛哉。惟達生散立方平正。奈只可調理於產前。生化湯用意甚深。又只可調理於產後。並非可濟危急催生之用者。今萬全湯乃體二方之意。合成一方。務取萬全。屢用甚驗。故以萬全名之。先以調補氣血。佐以散瘀下。

降溫中。使氣血得力。自能健用。催生。此不催之催也。故
用人參當歸爲君。培補氣血。壯其主也。少加棗仁、川芎、
黑薑、炙草、酒紅花。溫中而散其瘀也。牛膝稍。桂心。溫行。
導下。使無上逆衝心之患。不惟催生神效。產後更無瘀
血凝滯百病不生。補而兼溫。則不滯溫而兼補。則不竄。
升少降多。則氣得提而易下降。而兼升。則瘀自去而新
自歸。補多瀉少。邪去而元氣無傷。苦少甘多。瘀逐而中
和。仍在。豈非萬全催生者乎。

催生佛手散

全當歸 一兩

川芎 五錢

龜板 七錢 酥炙透

水煎服。○一方去龜板。加益母草三五錢。

油蜜飲 治產難數日不下。並瀝漿胞乾。

白蜂蜜 半碗

正麻油 半碗

共一碗。煎一二沸。掠去浮沫服。○一方加童便服。

三合濟生湯 治臨產艱難。一二日不下。服此自然

轉動下生。

當歸 三錢

川芎 二錢

枳殼 二錢、麸炒

紫蘓 八分

大腹皮 一錢五分、薑汁洗

甘草 七分

水煎服。待腰痛甚。服之即產。

魚膠散 治難產。

魚膠 五錢、同麪炒成珠、去麪、將膠研細末、用熱酒衝服、少頃即產。

催生簡易方

催生時。藥不便。就將本年大統曆日黃紙殼面。刊有飲天

監奏准 云。並有印信在上者。扯來。不要人見。用火燒爲

灰。將灰調酒一盃。與產婦吞之。即時產下。又有請本地方

官或府州縣差籤一枝。在籤上硃書某縣知縣某人。要寫

名字。

在此立候催生。將籤字倒豎於產房門檻內。卽刻產下。仍卽將籤繳回本縣。奇驗。奇驗。

催生如意散 臨產腰痛。方可服之。

人參 一錢

乳香 一錢

辰砂 五分

共爲末。臨產時。用鷄子清一個。調藥。以生薑自然汁調開。和勻冷服。如橫生。倒產。卽時轉正。子母全安。

催生芎歸湯

卽佛手散。但與佛手散煎服之法不同耳。故又名催生芎歸湯。治因事

觸胎。子死腹中。疼痛。口噤。用此探之。不損則痛止。
子母俱安。損則立下。臨產催生。並治橫逆難產等
證。

當歸 六錢

川芎 三錢

水二鍾半。煎欲乾時。入頭酒一鍾。煎沸。溫服。口噤。灌之。
如人行五里再服。不過三服。卽生。○有一婦人。生產三
日不下。用此方。加入益母草二兩。酒水各一碗。煎飲。服
之。卽生。○曾有人止用本方。治橫生。倒產。頻服。順生。屢
效。

葱白益母湯 治難產。

益母草 五錢、

葱頭 三錢、

用紋銀一錠。要重四兩。水二碗。煎一碗。服之即生。

神柞飲 催生甚速。○並治橫逆倒產。死胎在腹。

生柞樹刺枝 如小指大者一握。水洗淨。切碎。一葉一刺者。處處有之。

甘草 五錢。○一方五寸。新汲水 一碗半、

用新瓦鑊。入水與藥于內。以紙三層密封。文武火煎八分。溫服。不煎渣。○凡覺腹疼、腰重、欲坐草時。即將此藥溫服一盞。便覺心下開豁。如渴。又飲一盞。覺下重便產。

更無難生橫逆之患。若遇橫生倒逆。不過三服卽正。子死腹中。不過三服卽下。能保母子兩全。最爲神驗。曾有一婦橫產。兒手先出。至臍腫脹。欲截其手。不保其生。屢服催生藥不效。以此藥濃煎一碗與服。頃刻甦醒。再與一碗。因睡少時。忽云。我骨節都拆開了。快扶我起來。血水湧下。拔出死胎。全不費力。此方救人百發百中。然據石室秘錄云。宜慎用。論見後加味神柞飲方中。

秘錄加味神柞飲

附論

治兒頭已到門。久而不下。

此交骨不開之故。

柞木枝 一兩或五錢

當歸 二兩

川芎 一兩

人參 一兩

煎湯服之。如兒頭到門。久而不下。服此。少頃。必然一聲
响亮。兒卽生矣。正至奇至神之方也。

論曰。倘兒頭不下。萬萬不可用柞木枝。蓋此味。尚開交
骨。兒未回頭。而兒門先開。亦死之道。故必須兒頭到門
而後可用此方也。予謂前方獨用柞木枝。治橫逆及難
產。且云。欲坐草時。卽溫服一盞。須防太早有失。不若俟
兒頭到門。久不下時。服之。爲當。

乳硃丹 一名開骨膏 治難產并交骨不開。

乳香 不拘多少

或遇三月三日。五月五日。七月七日。研細用猪心血爲丸。梧子大。硃砂爲衣。晒乾收藏。值難產者。以涼酒化下一丸。不產再服。或蓮葉蒂七個。水二鍾。煎一鍾。化服神效。

伏龍肝 治橫逆難產

伏龍肝 卽對灶心之土。多年紅者佳。

速研細末。溫酒調下一錢。兒頭卽帶土而出矣。

二脫散 治橫逆難產、

蛇脫 全一條

蚕故紙 一張

二味、新瓦瓶內。鹽泥固濟。燒存性。爲末。煎乳香湯。調下一錢。連三服神效。○綱目、煎榆白皮湯。調下一錢。○予謂此方藥峻。宜慎用。

膠葵散 治橫逆難產、

阿膠 一兩、蛤粉炒成珠、

黃葵子 一兩、

每服四錢。水煎服。

催如神散 一名黑神散、

治橫逆產。並治月水不止。崩漏證。

百草霜

血得黑則止。胞水過多。催生可用。

白芷

各等分。不見火。

爲末。每服二錢。以童便。醋。和如膏。加沸湯調。連進三服。能固血。又免血涸。○一方。加滑石。每服三錢。

催生如聖散 治胞水乾澁。兒在腹中不動。或漿血

來。閉塞道路。難產之證。

黃葵花

二錢。焙乾。

爲末。熱湯調下。神效。或有漏血。胎臟乾澁。難產痛劇者。併進三服。良久腹中氣寬。胎滑卽時產下。○如無花。以黃蜀葵子。爲末二錢。酒服亦可。○如胎死不下。紅花煎

酒調下。○經驗方、用子四十九粒。或三十粒。歌曰、黃金
丙子三十粒。細研酒調能脩急。命若懸絲在須臾。即令
眷屬不悲泣。

手握丹

即兔腦丸

治產婦生理不順。臨產艱難。

十二月兔腦髓

去皮膜、研成膏

乳

香

一分、研細、○一方二錢、無麝香

母丁香

一錢、研末

麝

香

一字、研細

將藥研勻。用兔兒腦髓和丸。如芡實大。陰乾。油紙封貯。
每一丸。溫水送下。則男左女右手握出。

琥珀黑龍丹

治臨產難生。或胎衣不下。產後血暈。

不省人事。血崩。惡露腹中刺痛。血滯浮腫。血入心

經。語言顛倒。血風相搏身熱頭痛。胎前產後諸證。

五靈脂

酒研。漚去沙。

當歸

酒洗。

乾地黄

川芎

良薑

各二兩。

右入砂鍋內。紙筋鹽泥封固。煨紅。候冷取出研細。

百草霜

三錢。

乳香

生硫黃

琥珀

花蕊石

煨。各二錢。

胎產心法

卷中

催生方

三

右五味。計一兩一錢。爲末。同前研細之藥和勻。米醋煮麪糊爲丸。如彈子大。每臨用。炭火煨藥通紅。投入生薑自然汁浸碎。以無灰酒童便相合頓服。予謂此藥峻厲。亦宜慎用。

催生起痘神驗方 治難產。並治痘瘡不長。不漿。

山羊肉 七八分。或一錢

此血用酒化開服之。頃刻卽產。且不傷人。又無產後瘀阻血暈之患。有云。此血仍聚兒頂而出。○又治小兒出痘不起長。不貫漿。亦用此血。量兒大小。或幾厘。或一二

分。或三四分。加以酒娘化服。其痘不起長者。卽起長。不
貫漿者。卽起漿。與用鷄冠血酒娘之意相同。然鷄冠血
不如山芋血多多矣。

尊生救生湯 治難產并交骨不開。

全當歸 一兩、

川芎 二錢、

龜板 一片、酥炙脆打碎、頭髮 一握、燒灰存性、

酒水煎服。○虛人或產多力衰者。加人參 二三錢。如人

行四五里卽下。不下。急宜再服。其他催生藥皆受傷。○

予謂此方卽加味芎歸湯。分兩雖殊。藥味則一。尊生用

之而驗。多在虛人加參之力耳。

神應丹

又名萬全膏

草麻子

七粒、去殼、

將草麻研如泥。入麝一分。再研成膏。塗產母足心。胎下
卽洗去。遲則恐子腸出也。如子腸出。卽移塗產婦頂心。
腸卽收上。速去之。此方催生下胎雖速。藥性猛峻。用者
慎之。○一方、草麻子四十九粒。去殼、研爛。治盤腸產。敷
在產婦頂心。待腸收盡而急去之。

催生湯

見上卷胎不長養門○又名補血行滯湯

胎產金丹

達生散

保產無憂散

滑胎散

以上俱見本卷保產門預服易產諸方

救逆湯

見本卷臨產須知

紫蘓飲

見上卷安胎門

脫花煎

見本卷子死腹中門

丹溪佛手散

見上卷諸痛門附佛手散下

子死腹中論

凡孕婦胞衣未下。急于胎之未生子。死腹中。急于胎之未下。盡胞衣未下。子與母氣尙通。呼吸。若子死腹中。則軀形已冷。胞臟氣寒。胎血凝。沍氣不升降。欲下死胎。若以至寒之藥用之。不惟無益。而害母命者多矣。所以古人有用附子湯。使胞臟溫煖。疑血流動。以附子能破寒氣。墮胎也。又有因患傷寒。熱病。溫瘧之類。胎受邪熱。毒氣內外交攻。因致胎死。畱於胞臟。古人深慮胎受毒氣。必然脹大。故用朴硝、水銀、礪砂之藥。不惟使胎不脹。又能使胎形化爛。再副以行血順氣之藥。死胎卽下。此古人立方之意。後人遵意。

倣而行之。所以有立候下胎散一方。然藥味俱多峻厲。且有爛肉之能。卽遇壯實村婦。予猶未敢輕用。又何敢施於富貴弱質之體哉。况予屢見死胎。人不慌迫。亦能遲遲生下。並不傷母。其故何也。蓋人腹中極熱。食物入內。俱化其胎。雖死。若產母不驚恐。能安心飲食。腹內熱氣薰蒸。胎自柔軟。腐化亦生。而不傷母。但所出穢氣。令人難聞耳。予每治胎死不下。用胎產金丹一粒。服下。頃刻卽生。但子死在腹。其故多端。要不過急去其死胎。以安產母。如胎氣薄弱。不成而殞。如產母久病。胎萎而死。如胎肥氣滯。惡露已盡。

致胎乾子死。身冷不能出。如臨產孕婦護痛。兩足不開。夾住兒頭。以致子死。如閹閹忍耐。當直之人。不善扶持。緊抱其腰。傷胎而死。如生路不順。逆側等證。穩婆蠢厲。用手莽撞。傷子而死。如臍帶纏項。氣絕而死。如兒頭到門。交骨不開。久而不下。以致子死。如孕至五七個月。胎漏跌仆。時證等類。傷胎而死。用烏金散。脫花煎。香桂散。牛膝。琥珀等丸。新法下胎。神柞飲類。擇其宜服者服之。死胎自下。又有雙軀。一死一生者。不可不知。但雙軀之脉。三陽俱盛。如少陰腎脉微緊。血卽凝濁。經養不周。胎卽偏夭。或因難產。一死

一生不去其死。害母失胎。千金神造散主之。但恐虛弱人下胎。或有貧富不等。醫藥一時未便。予故又擇諸書內九散及簡易單方。開載於後。以備選用。然下胎最宜謹慎。必先驗明產母。面赤舌青。腹中陰冷。重墜。口穢氣喘。的確。方可用下。若見紫黑血塊。血縷。猶爲確候。亦必先固姪婦本元。補氣養血。而後下之。予故重佛手散。香桂散。滑胎煎。爲下死胎之王道藥也。倘孕婦遇有不安。醫者未能審詳。遽用峻厲攻伐。難免不測之禍。慎之。慎之。

立候下胎散 治臨產。或橫逆。或血海乾涸。或胎死

不下。死在頃刻。

皮

硝

一錢、少壯者、一錢五分、

大附子

體弱者、加三五分、煨去皮、壯者不用、

如寒天。亦加附子、

三五分、煨去皮、

用黃酒半鍾。煎一二沸。溫服、

立下。

烏金散

局方名黑神散。靈苑名肉桂散。

治產難。或熱病。胎死腹中。或

因顛仆。或從高墜下。或房室驚搐。或臨產驚動太早。觸犯禁忌。或產時未到。經行先下。惡露已盡。致胎乾。子死身冷。不能出。

熟

地

酒焙乾、

蒲

黃

當歸

交趾桂

芍藥

軍薑
即炮薑、去皮、

粉草
各一兩、

小黑豆
二兩、炒、

百草霜
五錢、

右爲末。每用二錢。米醋半合許。沸湯六七分。浸起溫服。
疑貳之際。且進佛手散。酒水合煎二三服探之。若未死。
子母俱安。若胎已死。立便逐下。如的知其胎已死。進此
藥後。更進香桂散。須臾如手推下。常用催生。更加好滑
石末半兩。葵子五十粒搥碎。黃柞葉七八皮。葱白二寸。

胎產心法

卷中 子死腹中方

三

順流水煎湯調下。蓋滑石能利小便。柞葉行氣逐血。葱
白能通陽氣。氣盛血行卽產矣。○查局方黑神散。無百
草霜。用童便酒各半調服二錢。○良方黑神散。有炮附
子半兩。無蒲黃。○簡易方黑神散。止用百草霜一味。○
又有加乳沒血竭之黑神散。○綱目用熟地一觔。生薑
半觔。同炒乾爲末。烏梅湯下。錢二爲治產後塊痛之黑神
散。俱各有證治。錄此以別黑神散之方不一。

脫花煎 凡將產者。宜先服此藥催生。最佳。并治產
難經日。或死胎不下。俱妙。

當歸

七八錢或一兩

肉桂心

一二錢或三錢

川芎

牛膝

各二錢

車前子

一錢五分

紅花

一錢催生者不用此味亦可

水二鍾煎八分熱服或服後飲酒數盃亦妙○若胎死

腹中或堅滯不下者加朴硝一二錢即下○若氣虛困

劇者加人參隨宜○若陰虛者加熟地三五錢

香桂散

一名桂香散附救苦散

治胎死腹中不下簡便而最效

桂心

三錢

麝香

三分○一方五分

為末葱湯調服死胎即出溫童便酒調亦可○加生川

烏三錢。爲下私胎猛劑。○一方、單用桂末一錢。童便調

下。各救苦散。或童便酒調亦可。

牛膝丸 下死胎。

杜牛膝三兩、

紫金簾卽紫木香、

蜀葵根各七錢、

當歸四錢、

肉桂二錢、

麝香五分、

右爲末。米糊爲丸。如梧子大。硃砂爲衣。每服五十九。乳香湯送下。

琥珀丸 治婦人或老少。或產前、產後、百病。及療三

十六種諸病。七疝八瘕。心腹刺痛。卒中癱瘓。半身不遂。八風十二痺。手足瘦疼。乳中結核結毒。懷胎驚動。傷犯不安。死胎不下。

琥珀

硃砂

各另研

沉香

阿膠

炒珠

附子

製

川芎

肉桂

五味子

石斛

各五錢

牛膝

酒浸

當歸

肉蓯蓉

酒洗去泥晒

胎產心法

卷中

子死腹中方

四

人參

熟地

續斷

木香

沒藥

各一兩

右煉蜜爲丸。彈子大。每服一丸。空心。食前。午後。溫酒化

開服。○一方有牛黃、珍珠、乳香、元胡。各一兩。共二十一

味。爲丸。脩服。○凡服法。或薑湯。或米湯。或酒。或燈心湯。

隨證用引。○若傷寒中風。角弓反張。用麻黃湯送下。○

孕婦臨月。宜一日一服。至產順利。不覺疼痛。○凡婦人

服至五服十服之後。日倍飲食。其功不能盡述。服者當

自覺也。

新法下胎方

即平胃散之變局。比平胃散穩妥。

治胎死腹中最妙。或

有用半劑者。

當

歸一兩、

厚朴三錢、

陳皮

二錢、

酒水各一鍾。煎至一鍾。入朴硝。或一錢。或二錢。再煎十餘沸。去粗。熱溫服。死胎自下。或化水而出。或止用脫花煎更妙。脫花煎方見前。或用佛手散。以酒調服亦妙。

千金神造散 如妊婦雙軀。一死一生。服此。生者安。

死者出矣。

蟹爪 一升

阿膠 二兩

甘草 二錢

以流水先煮蟹爪、甘草，去滓。內阿膠，烱化服之。血凝不下。加桂心三錢。此方用蟹爪以去其死。阿膠以安其生。甘草和藥性。

扶羸小品方 虛弱人欲下胎。宜用此。

人參

粉草

川芎

肉桂

乾薑

桃仁

黃芩

蟹爪

右等分。每服一兩。水二鍾。煎八分。空心服。未動再服。

仙傳保命丹

一名安穰丸。又名奪命丹。

凡孕婦下血不止。或小產

下血。及子死腹中。其人憎寒。手指甲黑。唇青。面色

黃黑。胎上攻心。冷汗自出。悶絕欲死。或食惡物毒

藥。傷動胎氣。下血不止。胎尚未死。服之可安。胎若

已死。服之自下。此方得之仙傳。與黑龍丹媲美。皆

產科之聖藥也。

丹皮

赤芍

桂心

桃仁

白茯苓

各等分

右爲細末。蜜丸彈子大。每服一九。細嚼。淡醋湯下。連進三九神效。

官桂散 治產婦面赤舌青。子死母活者。或面青舌

赤。沫出。母死子活者。或唇舌俱青黑。沫出。子母俱死者。此方下死胎如神。

官桂

五錢去皮

丹皮

川芎

葵子 各一錢五分

爲末。葱白煎湯調下三錢。

黑神散 凡臨產血多。胎爲血裹。以致難產。宜棄子救母。橫生逆產。子死腹中。以及胎衣不下。血迷心竅。頭暈眼花。敗血乘虛流散。四肢浮腫。口渴舌燥。乍寒乍熱。煩燥發狂。言語錯亂。其狀如顛。或月內飲冷。敗血凝聚。大便艱難。小便閉澀。或血流小腸。小便出血。或惡露未盡。悞食酸物收斂。因而崩漏。或肺敗鼻中氣黑。或敗血衝心。喉口氣急。或血滯

脾胃。心腹脹滿嘔吐。亦似霍亂。服之神效。

當歸

熟地

白芍

煨

肉桂

炙草

各一兩

棕灰

蒲黃

沒藥

血竭

各五分

乳香

三錢

赤芍

八錢

爲細末。每服二錢。溫酒調下。

鷄熨下死胎法

烏雞一隻

去毛。細切。水煎二三升。候湯通手。用衣帛蘸摩腹中。胎自出。

下胎单方

牛糞不拘多少。

右牛糞炒極熱。入醋半盞。以青布包裹。于母臍上下熨之。立下。

千金榆皮湯 治胎死腹中。或母有疾。欲下胎。

榆白皮 一握

右白皮煮汁服之。自下。

返魂丹 治生產諸證。并死胎惡血。胎衣不下。橫生。

逆產。產前清熱養血。產後推陳致新。

野天麻

一名益母草。四五月採花葉子。陰乾半觔。

赤芍

六錢

當

歸

七錢

木香

五錢

爲末。蜜丸彈子大。或童便酒。或薄荷湯。或米飲。或桂枝湯。或棗湯。或秦艽湯。隨證酌湯。化下一丸。

胎產金丹

滑胎煎

俱見本卷保產門易產方

神柞飲

見本卷催生門

佛手散

見上卷諸痛門

胞衣不下論

婦人一生莫重於生產。臨產莫急於催生。既產莫甚於胞衣不下。所以不下者。有因血少乾澁。或子宮空虛。吸貼而不下。有因氣血虛弱。產母力乏。氣不轉運。不能傳送而停閣不下。其證但見無力。腹中不痛脹。治當補氣助血。速煎生化湯。大劑連進。二三鍾。或兼進益母丸。使血旺氣和。而衣自下。或用保生無憂散以固元氣。至千萬審齋用五苓

散。予恐無助血之能。不敢遵而用之。不若景岳全書決津煎。或滑胎煎。無憂散。局方黑神散之類。又有因惡露流入胞中。脹而不能出。蓋兒既生。胞帶必下墜。故胞在腹中。形如荷葉之仰。仰則盛聚血水而脹碍難下。將兒抱定。不可斷臍帶。惟老成有識。見穩婆以右手二指緊跟臍帶而上。帶盡處。將指向上半寸餘。摸之。覺有血便是胎衣。向下一捺。其血覆其衣。自下。或以手指頂其胎底。使其血散。或以指摸上口。攀開一角。使惡露傾瀉。則腹空自下矣。法甚簡明。當爲下胞衣第一妙法。亦有人因衣遲不下。恐天寒不

便於子。急斷臍洗兒。用帛繫墜臍帶。其繫法。已見前候胞衣生下。須知論中矣。但血滲胞中不下。又不能用手法下之。停蓄既久。漸克心胸。爲脹痛。或喘急。非逐血破血不可。古人用良方奪命丹。或用失笑散。以熱酒調服。使血散脹消衣下。緩則不救。又有下胎衣單方。擇錄以脩鄉村無藥處急迫之用。世俗有以本婦頭髮。令攪入喉中。使之作嘔。則氣升。血散。胞軟亦自下矣。亦有用產婦鞋底。炙熱。熨小腹上下。卽出。又有血極膏。三奈方。花蕊石散。良方牛膝散。神應丹。灸足小指法。牛膝湯。蛇脫烏金丸。半夏散。皆治胎

衣不下之方。予謂既有手法下衣簡便。又不傷人。當以用手。法爲最。至於吐法。雖效。如不出。反逆上者。必死。至下胎衣諸方中。用硝、滕、花、蕊、石、硫、黃等藥。非惟不效。即使得下。胃氣大傷。況金石峻厲之品。恐非腸胃大虛者所宜。後方錄之以備參考耳。用者慎之。況藥力未必如手法之速效。而無損于人也。如不能手法。必欲用藥。總不若以失笑散。或萬全湯去人參。並可取效爲至當。其次亦惟決津煎爲善。

益母丸

一名返魂丹。○附益母膏。

治婦人赤白帶惡。

露時下不止。及治胎前產後經中諸般奇痛。無所
不療。本草云。此草胎前無滯。產後無虛。故名益母。

益母草

一味。○一名克蔚子。一名野天麻。方梗。對節生葉。葉類大麻。四五月開紫花。是白花者非。

右于五月採取晒乾。連根莖葉。勿犯鐵器。磨爲細末。煉
蜜丸。如彈子大。每服一九。用熱酒和童便化下。或隨證
用湯引送下。○一方。以此爲末。每服二錢。或酒。或童便。
或隨證用引服之。○一方。凡產時倉卒未合。只用生益
母草搗汁。入蜜少許服之。其效甚大。○一益母膏方。依
前採取搗爛。以布濾取濃汁。用砂鍋文武火熬成膏。如

黑砂糖色爲度。入磁磑收貯。每服二三匙。酒便調下。或于治血湯藥中。加一匙服之。猶妙。

良方奪命丹 治瘀血入胞。脹滿難下。急服此藥。血卽消。衣自下。○予謂此方藥峻。不可輕用。

附子

炮五錢

乾

漆

碎炒烟盡

牡丹皮

當

歸

各一兩

右爲末。另用大黃末一兩。以好醋一升。同熬成膏。和前藥丸。桐子大。溫酒吞五七丸。

失笑散 治婦人心痛氣刺不可忍。及產後兒枕畜

血惡血上攻疼痛。并治小腸氣痛。更治胞衣由瘀血脹滿不能出者。

五靈脂

生酒研澄去沙

蒲黃

生篩淨

爲末。每服二三錢。葱湯調末服之。○一方用酒煎熱服。○一方用好醋一杓熬成膏。再入水一鍾。煎至七分熱服。○一方用醋糊和丸。龍眼大。每服一九。以童便和水。各半鍾。煎七分溫服。○按此方如行血。各等分俱生用。如止血俱炒用。或五靈脂減半用。○若用以止痛。蒲黃宜減半。又一方。蒲黃一半生。一半炒用。

下胎衣單方 治胞衣不下。此方與前下死胎相同，但治法各別，故重錄之。

黑牛糞 不拘多少。

右畧焙。帶潤。以布裹之。束于腹上。卽下。

又方 治胞衣不下。

芒硝 三錢。 牛膝

當歸 各五錢。

黃酒煎服卽下。○非壯實婦人。此方不可輕投。

血極膏 又名醋大黃丸。 治胞衣不下。惡血衝心。並腹

中血塊衝逆作痛。

錦紋大黃 一兩

右爲末。以好醋半升。熬成膏。丸桐子大。以酒化五丸服之。須臾卽下。○又治女人乾血有熱。脉弦數者。臨卧溫酒化服。大便利一二行。經脉自通。亦治經閉。通用。

三柰下胞方

三 柰 一二片 含口內。有水嚥下。其胞自落。

花蓋石散 治胎衣不下。胎死腹中。並治產後敗血

不盡。惡血奔心。血暈等證。或至死而心頭尙熱。急

以童便調服一二錢。取下惡物如鷄肝片。終身不

患血虛血暈。若膈上有血。化爲黃水。卽時吐出。或從小便而下。並治諸血凝滯。氣絕欲死。凡血證人弱。不能攻者。服之。凝血皆化爲水。

花蕊石

一兩

硫黃

四錢

爲粗末。入瓦瓶內。鹽泥固濟。晒乾。以炭火叢堆。煅煉一日。候冷。取出。再研細。用一錢。童便調服。○此石藥也。不可輕用。姑錄之以備參考耳。因產後腸胃之虛。何堪當此也。

良方牛膝散 治胞衣不下。腹中脹痛。急服此藥。腐

化而下。

牛膝

川芎

朴硝

蒲黃 各三兩

當歸

一兩五錢

桂心 五錢

每服五錢。薑三片。加生地黃一錢。水煎服。

灸足小指法 治難產及胞衣不下。

將產母右足小指尖上灸三炷。炷如小麥粒大。即易產也。

此法或可治村農不裹足婦人。若纏足者。則不便行之矣。

千金牛膝湯 治兒產胞衣不下。

牛膝

瞿麥 各一兩

當歸

通草 各一兩五錢

滑石 二兩

葵子 半升

右六味。水煎分三服。○一方無滑石。有桂心一兩。

蛇蛻烏金丸

胞衣不下。古法用蛇蛻一條。香油燈上燒研。入麝香爲末。

童便調服。或加蘄艾、阿膠、蘓木、各一錢。麥芽末打糊爲丸。

名烏金丸。遇有難產及死胎不出。俱童便服之。○亦有單

用蛇蛻酥炙爲末。童便調下一錢匙者。

半夏散 治產婦肥盛多痰。阻逆氣道而至產難。及

子死胎乾。或子下而胞衣不出。

半夏 製不拘多少。

右爲散。童便服方寸匙。連進三服。并用吹鼻取嚏。以激動關竅大妙。

生化湯 見下卷生化湯論後

保生無憂散 見本卷保產門易產方

決津煎 見上卷鬼胎門

滑胎煎 見本卷保產門易產方

局方黑神散

見本卷子死腹中門烏金散卽此方也
○治胎衣不下。用童便、酒各半調服。

神應丹

保產萬全湯

俱見本卷催生門

交骨不開論

交骨不開者。陰血虛也。或年幼受胎。陰氣不足。陰不足。則氣不達。所以不開。或年大方嫁。脉絡長成。或元氣虛弱。胎前失調。皆有此證。用參、佛手散補而開之。或十全大補湯亦可。古法用加味芎歸湯。每見服此藥者。惡血凝滯。反成不救。惟大劑人參、童便入于芎歸劑中。助其氣血開闔。

之功立致也。證見咬牙昏暈。急以熱小便灌之。稍遲則無濟矣。若元氣不虛者。只用佛手散入小便服之。人參不必用也。又有用開骨膏。以參便佛手散煎湯送下。予謂又不如用加味神柞飲。開交骨如神也。○予曾治彭姓女。初次生產。經日不下。交骨不開。神柞飲並諸催生藥。服之無效。用人參三錢。煎服立下。

參便佛手散 治臨產交骨不開。其驗如神。

當

歸

三錢

川

芎

一錢

人

參

三五錢。去血過多。加至一兩。

水煎。臨服入童便半盞。續續進之。質壯氣實者。但加童便。其參不用可也。

加味芎歸湯 治交骨不開。並死胎不下。

川芎

當歸 各一兩。

龜板

一個。自死者。酥炙。

婦人髮

五錢。曾生子者。燒存性。

右共爲末。每服一兩。水煎服。

開骨膏

治交骨不開。

○即催生方乳硃丹彼兼治難產此獨開交骨

明乳香

一兩。

五月五日研細。猪血爲丸。如鷄豆大。硃砂爲衣。

涼酒化服一丸。

十全大補湯

見上卷胎不長養門

佛手散

見上卷諸痛門

加味神柞飲

見本卷子死腹中門

獨參湯催生

見本卷催生門

胎產心法卷之中

畢